

**FICHA TÉCNICA****BYKAHEPAR®**  
Clanobutina sódica 106,4 mg  
Solución inyectable**Composición:**

Cada ml de solución inyectable contiene:

Clanobutina sódica 106,4 mg  
(correspondiente a 100 mg de clanobutina base)  
Excipientes c.s.p. 1 mL

**Indicaciones de uso:**

Se puede emplear con éxito en todas las enfermedades primarias y secundarias que necesitan una activación de todos los procesos de secreción relacionados con la digestión: sobrealimentación, timpanismo, acetonemia, constipación, intoxicaciones alimenticias, disminución del apetito, cólicos gaseosos, atonía intestinal, etc.

Se puede emplear sólo o en combinación con otros productos orales.

**Caballos:**

- Sobrealimentación de hidratos de carbono (concentrado, avena, etc).
- Obstipación
- Atonía intestinal
- Cólico gaseoso
- Intoxicación alimenticia
- Hepatitis

**Perros:**

- Inapetencia
- Alteraciones digestivas de todo tipo
- Coprostasis
- Atonía intestinal
- Disfunciones pancreáticas
- Hepatitis

**Especies de destino:**

Caballos y perros.

**Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:****Dosis:**

1 – 2 mL por cada 10 Kg de peso (equivalente a 10-20 mg de Clanobutina base/kg peso vivo).

**Frecuencia:**

Repetir en forma eventual después de 12-24 horas.

**Vía de administración:**

Vía intramuscular o intravenosa lenta.

En caballos administrar solo por vía intravenosa lenta.



## FICHA TÉCNICA

---

**Modo de empleo:**

Se puede emplear solo o en combinación con otros productos orales.

No mezclar con soluciones de calcio.

**Contraindicaciones:**

No administrar a animales con pancreatitis aguda, obstrucción de las vías biliares y/o íleo de origen funcional.

No administrar a animales hipersensibles a clanobutina.

**Advertencias y precauciones especiales de uso:**

La administración intravenosa debe hacerse lentamente (en tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar la aparición de los efectos no deseados.

Respetar las vías de administración propuestas para cada especie.

**Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

Ninguna.

**Efectos o reacciones adversas:**

Se ha descrito la aparición de somnolencia y pérdida de apetito. Tras la administración por vía endovenosa de forma excesivamente rápida, puede aparecer hipersalivación, pérdida de equilibrio, temblores musculares y vómitos que desaparecen espontáneamente en 30 minutos. En caso contrario, suspender el tratamiento.

**Uso durante gestación, lactancia y en animales reproductores:**

Se puede utilizar durante gestación, lactancia y animales reproductores.

**Período de resguardo:**

Caballos: No utilizar en animales destinados al consumo humano.

**Precauciones especiales para el operador:**

No manipular por personas hipersensibles a clanobutina.

En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

**Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar en lugar fresco entre 15° - 30°C y al abrigo de la luz.

Una vez abierto utilizar dentro de 28 días.

**Presentación:**

Estuche conteniendo un frasco de 100 mL.

**Fabricado por:**

TriRx Segré

La Grindoliere, Zone Artisanale, Segre.



## FICHA TÉCNICA

---

49500 Segré-en-Anjou Bleu, Francia

**Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA.**

**Reg SAG N°1184**