



DUPLOCILLINE®  
Suspensión Inyectable

## FICHA TÉCNICA

### DUPLOCILLINE®

Penicilina G procaínica 150.000 U.I. - Penicilina G benzatínica 150.000 U.I.  
Suspensión inyectable

#### Composición:

Cada mL de producto contiene:

Penicilina G procaínica	150.000 U.I.
Penicilina G benzatínica	150.000 U.I.
Excipientes c.s.p.	1 mL

#### Indicaciones de uso:

Para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la penicilina en caballos, bovinos, ovinos, cerdos, perros y gatos, donde se requiere una terapia prolongada con una sola inyección.

#### Especies de destino:

Bovinos, caballos, ovinos, cerdos, perros y gatos.

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

##### Vía de administración:

Inyección intramuscular profunda o subcutánea.

##### Dosis:

Bovinos y caballos	: 1 mL/25 kg de peso corporal. (6 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de penicilina G procaína y 5 mg/Kg ó 6000 UI/Kg de penicilina G benzatína) Por inyección intramuscular.
Cerdos y ovinos	: 1 mL/20 kg de peso corporal. (7,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg de penicilina G procaína y 6,5 mg/Kg ó 7500 UI/kg para penicilina G benzatína) Por inyección intramuscular.
Perros y gatos	: 1 mL/10 kg de peso corporal. (15 mg/Kg ó 15000 UI/kg de penicilina G procaína y 12,5 mg/Kg ó 15000 UI/kg para penicilina G benzatína) Por inyección subcutánea.

##### Intervalo de dosificación:

El tratamiento debe repetirse a las 72 horas.

##### Modo de empleo:

Agitar el producto antes de usar.

Inyecciones repetitivas no deben ser colocadas en el mismo sitio anterior.

#### Contraindicaciones:

No administrar a animales alérgicos a la penicilina.

Individuos alérgicos a la penicilina, deben evitar el contacto del producto con la piel.

No usar cuando se encuentran microorganismos productores de  $\beta$ -lactamasas (penicilinas)



DUPLOCILLINE®  
Suspensión Inyectable

## FICHA TÉCNICA

---

### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

Mantener fuera del alcance de los niños.

No administrar más de 10 mL de producto por sitio de inyección.

### **Interacción con otros productos farmacéuticos:**

Puede ocurrir antagonismo entre Duplocilline® y preparaciones bacteriostáticas. Bacterias resistentes pueden surgir y mostrar una resistencia cruzada a otros antibióticos  $\beta$ -lactámicos. Se ha observado sinergismo con otras preparaciones bactericidas.

### **Efectos o reacciones adversas:**

Ocasionalmente se han observado reacciones alérgicas.

### **Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:**

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

### **Período de resguardo:**

Carne: 30 días.

Leche: No usar en animales cuya leche sea destinada al consumo humano.

No utilizar en equinos destinados al consumo humano.

### **Precauciones especiales para el operador:**

Individuos alérgicos a la penicilina deben evitar el contacto del producto con la piel. En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

### **Condiciones de almacenamiento:**

Almacenar entre 2° y 8° C. No congelar.

Una vez abierto, utilizar dentro de 28 días.

### **Presentación:**

Estuche conteniendo frasco con 30, 50, 100 ó 250 mL de producto. Incluye inserto.

### **Fabricado por:**

Intervet Productions S.r.l.,  
Via Nettunense KM 20.300,  
04011 Aprilia,  
Italia.

### **Importado y distribuido por:**

Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

**Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.**

### **USO VETERINARIO**

**VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA**

**Reg. SAG N°: 1344-B**