



BRAVECTO® 1M
Comprimido masticable

FICHA TÉCNICA

BRAVECTO® 1M

Fluralaner 45 mg - Fluralaner 100 mg - Fluralaner 200 mg - Fluralaner 400 mg
Comprimido masticable

Composición:

	Bravecto® 1M 45 mg	Bravecto® 1M 100 mg	Bravecto® 1M 200 mg	Bravecto® 1M 400 mg
<u>Fluralaner</u>	45 mg	100 mg	200 mg	400 mg
<u>Excipientes c.s.p</u>	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable	1 comprimido masticable

Indicaciones de uso:

Tratamiento y control de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*) en perros por 37 días.

El producto puede ser utilizado como parte de la estrategia de tratamiento para el control de dermatitis alérgica a la picada de la pulga (DAP).

El producto controla efectivamente las poblaciones de pulgas ambientales en áreas donde tienen acceso los perros tratados.

El tratamiento reduce el riesgo de infección por *Dipylidium caninum* a través de la transmisión por *Ctenocephalides felis*. El efecto es indirecto debido a la actividad del producto contra el vector.

Tratamiento y control de infestaciones por garrapatas *Rhipicephalus sanguineus* en perros por 37 días.

Las pulgas y garrapatas deben adherirse al huésped y comenzar a alimentarse con el fin de estar expuestas al principio activo.

Para el tratamiento de sarna demodéica causada por el ácaro *Demodex canis*.

Para el tratamiento de infestaciones por ácaro del oído (*Otodectes cynotis*).

Especies de destino:

Perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis

El producto debe administrarse en una dosis de 10-22,5 mg de Fluralaner/kg de peso corporal de acuerdo con la siguiente tabla:



BRAVECTO® 1M
Comprimido masticable

FICHA TÉCNICA

Peso corporal (kg) del perro	Número y concentración del comprimido a administrar			
	Bravecto® 1M 45 mg	Bravecto® 1M 100 mg	Bravecto® 1M 200 mg	Bravecto® 1M 400 mg
2 – 4,5	1			
>4,5 – 10		1		
>10 – 20			1	
>20 – 40				1

Para perros de más de 56 kg, deben utilizar combinaciones adecuadas de comprimidos masticables.

Una dosis insuficiente podría resultar en uso ineficaz y podría favorecer el desarrollo de resistencia.

Los comprimidos no se deben romper o dividir.

Vía de administración

Oral.

Modo de empleo

Administrar Bravecto® 1M en el momento o cerca de la alimentación.

Bravecto® 1M es un comprimido masticable y es bien aceptado por la mayoría de los perros. Si el perro no toma el comprimido voluntariamente, también puede administrarse con la comida o directamente en la boca. El perro debe ser observado durante la administración para confirmar que el comprimido tragado.

Esquema de tratamiento:

Para un control óptimo de infestación por pulgas y garrapatas, el producto debe administrarse en intervalos de 37 días. Bravecto® 1M puede administrarse durante todo el año.

Para el tratamiento de Demodicosis causada por los ácaros *Demodex canis*, el producto debe administrarse en intervalos de 1 mes por 3 meses consecutivos. La Demodicosis es una enfermedad multifactorial, se recomienda el diagnóstico y el tratamiento adecuado de cualquier condición subyacente.

Para el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*), el producto debe administrarse en intervalos mensuales durante 2 meses consecutivos.



BRAVECTO® 1M
Comprimido masticable

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No utilizar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

En ausencia de datos disponibles, este producto no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de vida y/o en perros que pesen menos de 1,6 kg.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Los parásitos necesitan comenzar a alimentarse en el huésped para ser expuestos a Fluralaner; por lo tanto, no puede excluirse completamente el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos (incluido *D. caninum*).

El uso innecesario de antiparasitarios o el uso que se desvía de las instrucciones proporcionadas en la etiqueta puede aumentar la presión de selección de resistencia y generar una eficacia reducida. La decisión de utilizar el producto debe basarse en la confirmación de la especie y carga parasitaria, o del riesgo de infestación según sus características epidemiológicas, para cada animal individual.

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que otros animales de la misma casa puedan ser una fuente de reinfección con garrapatas, pulgas y ácaros, y estos deben ser tratados según sea necesario con un producto adecuado.

En ausencia de datos disponibles, este producto no debe utilizarse en cachorros de menos de 8 semanas de vida y/o en perros que pesen menos de 1,6 kg.

El producto no debe ser administrado en intervalos inferiores a 1 mes ya que no se ha analizado la seguridad para intervalos más cortos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante preñez, lactancia, postura y en animales reproductores:

No se ha establecido la seguridad de este producto en animales reproductores, preñados o en lactancia, por lo que no se recomienda su administración.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Durante los estudios clínicos de campo, no se observaron interacciones entre Bravecto® 1 M 45 mg, 100 mg, 200 mg y 400 mg comprimido masticable y otros productos medicinales veterinarios de uso rutinario.



BRAVECTO® 1M
Comprimido masticable

FICHA TÉCNICA

Efectos o reacciones adversas:

Perros:

Raro (1 de 10 animales/10.000 animales tratados)	Vómito*.
Muy raro (<1 animal/10.000 animales tratados, incluyendo reportes aislados)	Diarrea*, inapetencia*, letargo*, tremor muscular*, ataxia y convulsión*.

*Eventos autolimitados y de corta duración.

Período de resguardo:

No aplica.

Precauciones especiales para el operador:

Mantener el producto en su envase original, en orden de prevenir que los niños tengan acceso directo al producto. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. Lavarse las manos con abundante agua y jabón inmediatamente después del uso de este producto. En caso de ingestión, NO inducir el vómito y consultar a un médico.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a menos de 30°C, en su envase original. No congelar ni refrigerar. Mantener alejado de la luz.

Presentación:

Estuche con 1, 3 o 6 blíster conteniendo 1 o 2 comprimidos. Incluye inserto.

Fabricado por:

Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210
Viena, Austria

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2623 / 2624 / 2625 / 2626