

FICHA TÉCNICA

CHORULON®

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG) 5000 UI
Polvo para reconstituir solución inyectable

Composición:

Cada frasco de polvo liofilizado contiene:

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG)	5000 U.I.
Excipientes c.s.p.	1 frasco

Cada frasco de diluyente contiene:

Excipientes c.s.p.	5 mL
--------------------	------

Cada mL de solución reconstituida contiene:

Gonadotrofina Coriónica Humana (HCG)	1.000 U.I.
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de uso:

- Mejorar la tasa de concepción en vacas y vaquillas.
- Tratamiento de quistes foliculares (anestros, estro prolongado, ninfomanía) en vacas y vaquillas.
- Optimización de la fertilidad en vacas y vaquillas.
- Inducción y sincronización de la ovulación en cerdas y chanchillas.
- Inducción de la ovulación en yeguas y perras.
- Anestro persistente en perras y yeguas.
- Ovulación retardada/estro prolongado en perras.

Especies de destino:

Bovinos (vacas y vaquillas)
Caballos (yeguas)
Perros (perras)
Cerdos (cerdas y chanchillas)

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Vía de administración:

Vía intramuscular o endovenosa.

Modo de empleo:

Con una jeringa, retirar todo el diluyente y reconstituir el frasco de polvo liofilizado. Mezclar agitando cuidadosamente asegurando que el polvo liofilizado sea totalmente disuelto.

FICHA TÉCNICA

Dosis:

Especie animal	Indicación	Dosis y Administración
Vacas y vaquillas	Mejoramiento del índice de concepción	1500 U.I., i.m. o i.v. al momento de la I.A./cruza
	Tratamiento de quistes foliculares	3000 U.I., i.v.
Cerdas y chanchillas	Inducción y sincronización de la ovulación (utilizando un programa de tratamiento con 15 mg de Altrenogest/animal 4 días antes de Chorulon®)	500 U.I., i.m. 24 horas antes o durante la I.A./cruza
Yeguas	Inducción de la ovulación (folículos $\geq 3,5$ cm de diámetro)	1500 – 3000 U.I., i.m. o i.v. 24 horas antes de la I.A./cruza
	Anestros (folículo ≥ 2 cm de diámetro)	1500 – 3000 U.I., i.m. o i.v. Repetir si fuese necesario a los 2 días.
Perras	Anestro	Después del pretratamiento con PMSG (Folligon), 500 UI, vía i.m. o i.v. al primer día del estro
	Ovulación retardada	100 – 800 U.I./día, vía i.m.

Contraindicaciones:

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo o alguno de sus excipientes.

No administrar en hembras pre-púberes.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Deben tomarse las medidas asépticas necesarias al momento de la inyección.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

Puede ser utilizado en animales con preñez temprana (hasta 2 semanas posteriores al apareamiento/inseminación). No utilizar al final de la preñez. Puede ser utilizado durante la lactancia.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

FICHA TÉCNICA

Efectos no deseados o reacciones adversas:

En casos aislados, al igual que con todos los preparados proteicos, se pueden presentar reacciones anafilácticas poco después de su aplicación. En tales circunstancias, el tratamiento indicado es la administración de adrenalina (1:1000) por vía intramuscular o endovenosa. También puede estar indicada la terapia con corticosteroides.

Período de resguardo:

Para todas las especies:

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

Precauciones especiales para el operador:

No existen diferencias fundamentales en el efecto de HCG en humano y en animales. La HCG puede influenciar la fertilidad en humanos después de la inyección. Se debe tener cuidado con la autoinyección cuando se utiliza Chorulon®.

En caso de autoinyección accidental, buscar atención médica inmediata y mostrar el inserto del producto al médico.

En caso de derrame accidental sobre la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a una temperatura ambiente, entre 15° y 30°C. Proteger de la luz.

Presentación:

Estuche conteniendo 5 frascos con producto liofilizado y 5 frascos con solvente. Contiene inserto.

Fabricado por:

Intervet International B.V.

Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxtmeer,
Holanda.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N° 1152-B