

CIRCUMVENT® PCV M
 Emulsión Inyectable

FICHA TÉCNICA
CIRCUMVENT® PCV M

Vacuna subunitaria Circovirus Porcino Tipo 2 e inactivada
Mycoplasma hyopneumoniae
 Emulsión inyectable

Composición:
Cada dosis (2 ml) contiene:

Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino Tipo 2, Cepa MSV-BAC/PCV2-ORF2; 98-99 1.2 ml/vial.24FEB03	≥ 1,3 RP
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , Cepa 11	≥ 1,3 RP
Excipientes c.s.p.	2 mL
Adyuvantes: Fortasol y Microsol	
Preservantes: Timerosal y Gentamicina	

Indicaciones de uso:

Como una ayuda para reducir la carga viral y la eliminación del Circovirus Porcino Tipo 2 asociado a enfermedades relacionadas con Circovirus Porcino Tipo 2 (PCVD) y para reducir las lesiones pulmonares asociadas a la infección por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Especies de destino:

Cerdos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:
Posología:

1 dosis de 2 mL. Revacunar a las 3 semanas.

Edad o peso:

A partir de las 3 semanas de edad.

Vía de administración:

Intramuscular

Modo de empleo:

- Antes de administrar, permita que alcance la temperatura ambiente
- Agitar antes de usar
- Administrar en forma aséptica

Contraindicaciones:

No vacunar durante gestación ni lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Vacunar solo cerdos sanos.

Mantener fuera del alcance de los niños.

CIRCUMVENT® PCV M
Emulsión Inyectable**FICHA TÉCNICA****Interacciones con otros productos farmacéuticos:**

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Se puede observar una reacción transitoria local en el sitio de inyección, que disminuye dentro de unas semanas. Puede ocurrir una reacción tipo hipersensibilidad; los animales se recuperarán dentro de unos minutos sin tratamiento adicional.

Período de resguardo:

Cero días.

Precauciones especiales para el operador:

Este producto contiene aceite mineral. Una inyección accidental o auto inyección accidental pueden resultar en dolor severo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos raros, puede resultar en la pérdida del dedo afectado si no acude a atención médica de inmediato.

Si usted es inyectado accidentalmente con este producto, busque atención médica de inmediato aunque sólo sea una pequeña cantidad inyectada y lleve el inserto interno con usted.

Si el dolor persiste por más de 12 horas luego del examen médico, busque atención médica otra vez.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar de 2° a 8° C. No congelar, proteger de la luz.

Presentación:

Frasco conteniendo 50, 100, 200 o 500 mL.

Fabricado por:

Intervet Inc.
35500 West 91st Street, DeSoto, Kansas,
USA.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°: 2244-B