

**FICHA TÉCNICA**

EXCELLER®
Doramectina 1%
Solución inyectable

Composición:

Cada 100 mL de solución contienen:

Doramectina	1g
Excipientes c.s.p.	100 mL

Indicaciones de uso:

Para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, piojos y ácaros de la sarna.

Nematodos Gastrointestinales y PulmonaresAdultos:

Bunostomum phlebotomum
Cooperia spp. (*C. oncophora*, *C. pectinate*, *C. punctata*, *C. spatulata*, *Dictyocaulus* spp.)
D. viviparus
Haemonchus spp. (*H. contortus*, *H. placei*)
Nematodirus spp. (*N. spathiger*)
Oesophagostomum spp. (*O. lyrata*, *O. ostertagi*, *O. radiatum*)
Ostertagia spp. (*Ostertagia ostertagi*)
Trichostrongylus spp. (*T. colubriformis*, *T. longispicularia*, *T. axei*)
Trichuris spp. (*Trichuris discolor*)

PiojosMasticadores:

Damalinea bovis

Chupadores:

Haematopinus eurysternus
Lignonathus vituli
Solenoptes capillatus

Estados inmaduros:

Cooperia spp. (*C. oncophora*, *C. punctata*, *C. surnabada*)
Dictyocaulus viviparus
Haemonchus spp. (*H. placei*)
Oesophagostomum spp. (*O. radiatum*)
Ostertagia ostertagi
Strongylus spp.
Trichostrongylus spp. (*T. colubriformis*, *T. axei*)
Trichuris spp.

Ácaros

Psoroptes ovis
Sarcoptes scabiei

Especies de destino:

Bovinos.



FICHA TÉCNICA

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

200 µg de Doramectina por kg de peso vivo, equivalente a 1 mL de Exceller® por cada 50 kg de peso vivo. Ver tabla de dosificación por peso como referencia.

Peso (kg)	Dosis (mL)
Hasta 50	1
51 – 100	2
101 – 150	3
151 – 200	4
201 – 250	5
251 – 300	6
301 – 350	7
351 – 400	8
401 – 450	9
451 – 500	10
501 – 550	11
551 – 600	12

Vía de administración:

Vía subcutánea, en las áreas de piel flácidas, en frente o detrás de la paleta.

Modo de empleo:

Producto listo para su uso.

Inyectar asépticamente.

Contraindicaciones:

No se han descrito.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

La resistencia parasitaria puede desarrollarse frente a cualquier antihelmíntico, y ha sido reportada para la mayoría de las clases de antihelmíntico.

Los periodos de tratamiento extensos con antihelmínticos de las mismas clases y subdosificación pueden resultar en un tratamiento inefectivo y aumentar el riesgo de desarrollo de resistencia parasitaria.

Asegurar la administración de la dosis adecuada para cada animal basado en su peso corporal para evitar la subdosificación.

El tratamiento con un antihelmíntico utilizado en conjunto con buenas prácticas de manejo contra los parásitos apropiadas para el área geográfica y el animal a ser tratado puede enlentecer el desarrollo de resistencia parasitaria.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No se describen.

Efectos o reacciones adversas:

No se han descrito.



FICHA TÉCNICA

Uso durante preñez, postura, lactancia y en animales reproductores:

No administrar a hembras preñadas.

Período de resguardo:

Carne: 59 días.

No usar en animales productores de leche para consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Evitar el contacto del producto con la piel y mucosas. Si esto ocurre, lavar la zona afectada varias veces con agua y jabón.

Evitar el contacto directo con ojos, en caso de contacto lavar inmediatamente con abundante agua corriendo. Si utiliza lentes de contacto, removerlos solo después de lavar ojos y luego continúe el enjuague con agua por al menos 15 minutos más. En caso de irritación, buscar atención médica.

Evitar la inhalación del producto mientras es dosificado y administrado a los animales, en caso de inhalación retirar a la persona a un ambiente bien ventilado. Si la persona no respira, realizar maniobras de respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno y buscar atención médica.

En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, solo si la persona esta consciente. Buscar atención médica.

En caso de auto inyección accidental, buscar atención médica de inmediato.

Utilizar elementos de protección como guantes y ropa de protección. En caso de contaminación, cambiar la ropa de trabajo.

No beber, comer ni fumar durante su manipulación.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar por debajo de 30°C. No congelar. No refrigerar.

Presentación:

Estuche con 1 frasco conteniendo 50 o 500 mL.

Fabricado por:

Vallée S.A.

Av. Comendador Antonio Loureiro Ramos, 1500

Distrito Industrial – Montes Claros

MG, Brasil

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Vallee S/A, Brasil

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°2606-B