
NUFLOR[®]
Florfenicol 300 mg/mL
Solución inyectable**Composición:**

Cada mL de solución inyectable contiene:

Florfenicol	300 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

Indicaciones de uso:

Bovinos: Para usar en el tratamiento y control de enfermedades respiratorias del bovino asociadas con *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes*.

Cerdos: Para usar en el tratamiento y control de enfermedades respiratorias del cerdo asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinus*, *Salmonella cholerasuis* y *Streptococcus suis* Tipo II.

Especies de destino:

Bovinos y cerdos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:Dosis:

Bovinos: 1 mL/15 kg (20 mg de florfenicol/kg de peso vivo), vía intramuscular. Una segunda dosis debe ser administrada 48 horas después.

Alternativamente, puede ser administrado mediante una inyección única, vía subcutánea con una dosis de 2 mL/15 kg (40 mg de florfenicol/kg de peso vivo). No administrar más de 10 mL de producto en cada sitio. La inyección debe ser colocada solo en el cuello.

Cerdos: 1 mL/20 kg (15 mg de florfenicol/kg de peso vivo), vía intramuscular. Una segunda dosis debe ser administrada 48 horas después. La inyección debe ser colocada sólo en el cuello.

Modo de empleo:

Agite bien antes de usar.

Limpiar el tapón antes de dosificar. Use una jeringa y aguja estéril y seca.

Contraindicaciones:

No usar en bovinos o cerdos en edad de encaste.

No administrar a animales hipersensibles a Florfenicol.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Al igual que otros antibióticos, su administración a dosis altas y/o prolongadas puede conducir a superinfecciones por gérmenes no sensibles como levaduras y hongos.

Bovinos: La inyección intramuscular podría resultar en una reacción tisular local, la cual persiste por más de 29 días. Estos pueden resultar en pérdida de tejido comestible al



NUFLOR®
Solución inyectable
FICHA TÉCNICA

sacrificio. La reacción tisular en otro sitio de la inyección que no sea el cuello es probablemente más severa.

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

No usar en hembras en periodo de gestación, lactancia o en animales reproductores.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No coadministrar con otra sustancia o medicamentos veterinarios.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Bovinos: Puede ocurrir después del tratamiento una disminución en el consumo de alimento y agua o diarrea pasajera.

Cerdos: Puede ocurrir después del tratamiento diarrea y/o eritema/inflamación perianal pasajera.

Período de resguardo:

Bovinos:

Carne (intramuscular): 28 días

Carne (subcutáneo): 38 días

No usar en terneros destinados al consumo humano. No se ha establecido un período de resguardo en terneros pre rumiantes. No usar en bovinos cuya leche sea destinada a consumo humano.

Cerdos:

Carne: 14 días.

Precauciones especiales para el operador:

No manipular por personas hipersensibles a Florfenicol.

En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua; se recomienda uso de guantes durante su manipulación. En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

Las mujeres embarazadas deben usar guantes y tener precaución o evitar manipular este producto, ya que se han informado toxicidades para la reproducción y el desarrollo en animales de laboratorio luego de exposiciones altas y repetidas a N-metil-2-pirrolidona (NMP).

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente por debajo de 30°C. No refrigerar ni congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo frasco de 20, 50, 100 o 250 mL. Incluye folleto interno.

Fabricado por:

TriRx Segré

La Grindolière, Zone Artisanale, Segré

49500 Segré-en-Anjou Bleu, Francia.



NUFLOR®
Solución inyectable
FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA

Reg SAG N°143