

FICHA TÉCNICA

PILIGUARD®

Bacterina *Moraxella bovis* trivalente
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Cepa *Moraxella bovis*, Cepa EPP 63 ≥ 1 PD

Cepa *Moraxella bovis*, Cepa Fla 64 ≥ 1 PD

Cepa *Moraxella bovis*, Cepa SAH 38 ≥ 1 PD

Excipientes c.s.p. 2 mL

-Inactivante: Formalina

-Preservante: Gentamicina

-Adyuvante oleoso

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, como ayuda en la prevención de la Queratoconjuntivitis Infecciosa causada por *Moraxella bovis*, en bovinos.

Especies de destino:

Bovinos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

2 mL

Frecuencia, intervalo y duración del tratamiento:

Administrar 3 a 6 semanas antes del inicio de la temporada de presentación de cuadros de Queratoconjuntivitis Infecciosa.

Se recomienda una revacunación anual.

Vía(s) de administración:

Vía subcutánea o intramuscular en el cuello.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.

La vacuna debe ser retirada del refrigerador y esperar que alcance la temperatura ambiente, antes de la administración.

Contraindicaciones:

No se han descrito.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

FICHA TÉCNICA

Uso durante preñez, lactancia y en animales reproductores:

No usar durante la gestación y lactancia.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto de la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo que no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos adversos o reacciones adversas:

Ocasionalmente se pueden presentar granulomas locales en el sitio de inoculación los cuales pueden persistir por varias semanas.

Reacciones inflamatorias locales pasajeras pueden ocurrir en el sitio de inyección.

En caso de presentarse reacciones anafilácticas, administrar epinefrina o sus equivalentes.

Período de resguardo:

60 días.

Precauciones especiales para el operador:

Se debe tener extremo cuidado al momento de inyectar la vacuna, por cuanto la auto inyección accidental puede causar serias reacciones locales.

Consultar inmediatamente a un médico si ocurre una inyección accidental.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener refrigerado, entre 2° y 8°C. No congelar.

Usar el total del contenido una vez abierto el frasco.

Presentación:

Frasco conteniendo 10 dosis (20 mL) o 50 dosis (100 mL).

Fabricado por:

Intervet Inc.

21401 West Center Road, Elkhorn, NE 68022,

USA.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V., Holanda

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MEDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1198-B