



CIRCUMVENT® CML
Emulsión inyectable

FICHA TÉCNICA

CIRCUMVENT® CML

Vacuna subunitaria Circovirus Porcino tipo 2 e inactivada
Mycoplasma hyopneumoniae, *Lawsonia intracellularis*
Emulsión inyectable

Composición:

Cada dosis contiene:

Antígeno subunitario ORF2, Circovirus Porcino tipo 2, Cepa MSV-BAC/PCV-ORF2; 98-99 1,2 mL/vial.24FEC.03	≥1,4 RP
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> , Cepa 11	≥1,2 RP
<i>Lawsonia intracellularis</i> , Cepa SPAH08	≥1,5 RP
Excipientes c.s.p.	2 mL

Adyuvantes: Microsol y Fortasol.

Preservantes: Gentamicina y Timerosal.

Indicaciones de uso:

Inmunización activa, como ayuda para disminuir la viremia y la depleción linfoide causada por Circovirus Porcino Tipos 2a y 2d, reducir las lesiones pulmonares asociadas a la infección por *Mycoplasma hyopneumoniae* y para la prevención y control de la ileitis provocada por *Lawsonia intracellularis*, reduciendo la colonización y disminuyendo la duración de la excreción fecal.

Duración de inmunidad:

- Circovirus Porcino Tipo 2a: no ha sido establecida.
- Circovirus Porcino Tipo 2d: al menos 16 semanas post vacunación.
- *Mycoplasma hyopneumoniae*: al menos 10 semanas post vacunación.
- *Lawsonia intracellularis*: al menos 20 semanas post vacunación.

Especies de destino:

Cerdos (lechones).

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis:

2 mL

Edad o peso:

Desde las 3 semanas de edad.

Condición fisiológica:

Animales sanos.

Vía de administración:

Intramuscular.

**FICHA TÉCNICA**

Modo de empleo:

Antes de administrar, permitir que alcance la temperatura ambiente.

Agitar antes de usar.

Administrar en forma aséptica.

Contraindicaciones:

No vacunar hembras gestantes ni en periodo de lactancia.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Minimizar la manipulación de los lechones y asegurar la ventilación apropiada antes de iniciar la vacunación.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

Un número significativo de cerdos pueden experimentar una hinchazón transitoria en el sitio de inyección. La hinchazón puede resolver sin tratamiento en menos de 29 días. Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los cuales se les ha administrado este producto. Si ocurre una reacción alérgica, tratar con epinefrina.

Uso durante preñez, postura, lactancia y en animales reproductores:

No utilizar en hembras preñadas o en lactancia.

Período de resguardo:

60 días.

Precauciones especiales para el operador:

Se debe tener precaución al utilizar para evitar la autoinyección en dedos, manos u otras partes del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales serias. En el caso de la exposición en humanos, contactar a un médico.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8° C. No congelar.

Presentación:

Fascos de 100, 500 o 1000 mL.

Fabricado por:

Intervet Inc. USA
35500 West 91st Street
DeSoto, KS 66018
Estados Unidos



CIRCUMVENT® CML
Emulsión inyectable

FICHA TÉCNICA

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N°2609-B