

**FICHA TÉCNICA****Nobilis® Coryza**

Vacuna inactivada *Avibacterium paragallinarum* serotipos A, B y C
Suspensión inyectable

Composición:Cada dosis contiene:

<i>A. Paragallinarum</i> Cepa 083 (serotipo A)	≥1 CPD ₇₀ ¹
<i>A. Paragallinarum</i> Cepa Spross (serotipo B)	≥1 CPD ₇₀ ¹
<i>A. Paragallinarum</i> Cepa H-18 (serotipo C)	≥1 CPD ₇₀ ¹
Excipientes c.s.p.	0,25 mL
Adyuvante: Saponina purificada	
¹ 70% dosis protectora pollo	

Indicaciones de uso:

Inmunización activa para la reducción de los signos clínicos de Coriza Infecciosa, causada por *Avibacterium paragallinarum* serotipo A, B y C y reducción de la tasa de reaislamiento bacteriano.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas.

Duración de la inmunidad: 52 semanas.

Especies de destino:

Pollas de reemplazo y gallinas ponedoras.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:Dosis:

0,25 mL

Edad o peso:

A partir de las 10 semanas de edad.

Esquema de vacunación:

- 1° dosis: entre 10-12 semanas de edad
- 2° dosis: revacunar a lo menos 4 semanas posterior a la primera dosis y a más tardar 4-6 semanas antes del inicio de la postura

Condición fisiológica:

Aves sanas.

Vía de administración:

Vía intramuscular.

Modo de empleo:

Agitar bien antes de usar.

Deben ser utilizados procedimientos asépticos comunes durante la vacunación.



FICHA TÉCNICA

Solo deben utilizarse jeringas y agujas estériles.

Contraindicaciones:

No vacunar dentro de las 4-6 semanas antes del inicio de la postura.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No existe información disponible respecto a la seguridad y eficacia para el uso concomitante con otros productos farmacéuticos, por lo cual no se recomienda administrar otros productos 14 días previos y posteriores a la inmunización.

Efectos o reacciones adversas:

Ocasionalmente se observa una hinchazón transitoria de suave a dura (10 mm) en el lugar de la inyección. Estas hinchazones desaparecen en 2 semanas.

Uso durante preñez, postura, lactancia y en animales reproductores:

No vacunar durante la postura.

Período de resguardo:

Cero (0) días.

Precauciones especiales para el operador:

En caso de autoinyección accidental, busque atención médica inmediatamente y muestre al médico el prospecto o la etiqueta.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar refrigerado entre 2° y 8°. No congelar. Proteger de la luz.

Presentación:

Frasco de conteniendo 250 mL (1.000 dosis).

Fabricado por:

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holanda

Importado y distribuido por:

Intervet Veterinaria Chile Ltda.
Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg. SAG N° 2691-B